



Palliative Reservemedikation[©]

Die aktuelle Medikation wurde geprüft und unnötige Medikamente abgesetzt: Ja Nein

Aktuelle Medikamentenliste im Anhang: Ja Nein

Namen des Patienten: _____

| Visum / Dat. Arzt* | Reservemedikation in der Palliativsituation | | | | Stop/ Visum Arzt |
|-----------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|
| | Schmerz | Übliche Dosierung | Innerhalb von 24 Stunden | Anmerkungen | |
| | Morphin Lösung 2% (1 Tropfen = 1 mg) | 2-5 Trpf. | bis 1 stündlich | | |
| | Morphin Amp. (10 mg / 1 ml) | 1-2.5 mg sc | bis 1 stündlich | | |
| | Mind. 1/10 der bisherigen Tagesdosis bei Vorbehandlung mit Opiaten | | | | |
| | anderes | | | | |
| | Angst | | | | |
| | Temesta Exp 1.0 mg | 1 mg | bis 1 stündlich bis max. 8/d | | |
| | Dormicum Amp. (5 mg / 5 ml) | 0.5 - 1 mg sc | bis 1 stündlich | | |
| | anderes | | | | |
| | Unruhe und/oder Delir | | | | |
| | Haldol Trpf. 2 mg / 1 ml (10 Tropfen = 1 mg) | 3-5 Trpf. | bis 1 stündlich max. 6/d | | |
| | Haldol Amp. (5 mg / 1 ml) | 0.5 mg sc (0.1 ml) | bis 1 stündlich max. 6/d | | |
| | Bei massiver Unruhe, Agitiertheit 3 Dosen Haldol, dann 1 Dosis Benzodiazepine (Temesta od. Dormicum) | | | | |
| | anderes | | | | |
| | Atemnot | | | | |
| | Morphin Lösung 2% (1 Tropfen = 1 mg) | 2-5 Trpf. | bis alle 20 Min. | | |
| | Morphin Amp. (10 mg / 1 ml) | 1-2.5 mg sc | bis alle 20 Min. | | |
| | Temesta Exp 1.0 mg | 1 mg | bis 1 stündlich max. 8/d | | |
| | Dormicum Amp. (5 mg / 5 ml) | 1 mg sc | bis alle 20 Min. | | |
| | anderes | | | | |



| Rasselatmung | | | | |
|---|--|-----------|-----------------------------|--|
| | Buscopan Amp. (20 mg / 1 ml) | 20 mg sc | bis max. 6/d | |
| | anderes | | | |
| Übelkeit / Erbrechen | | | | |
| | Motilium lingual 10 mg | 1 Tbl. | bis max. 3/d | |
| | Paspertin Trpf. (30 Trpf. = 10 mg) | 30 Trpf. | bis 6/d | |
| | Paspertin Amp. (10 mg / 2 ml) | 10 mg sc | bis 6/d | |
| | Haldol Trpf. 2 mg / 1 ml (10 Tropfen = 1 mg) | 3–5 Trpf. | bis 6/d | |
| | Haldol Amp. (5 mg / 1 ml) | 0.5 mg sc | bis 6/d | |
| | anderes | | | |
| Epileptische Anfälle / Status epilepticus | | | | |
| | Dormicum Amp. (5 mg / 5 ml) | 1 mg sc | Nach 30–60 Min. max. 2/d | |
| | anderes | | | |

Quelle: Palliativzentrum KSSG

| | |
|--|-------------------|
| Diese Verordnung gilt für alle hier aufgeführten Medikamente inkl. Dossierung (Einzelne Medikamente streichen möglich) | |
| Datum | Unterschrift Arzt |

| | | |
|--|-------------------|------------|
| Erreichbarkeit mit Arzt ist abgeklärt? | Ja Nein | Mobile-Nr. |
| Datum | Unterschrift Arzt | |
| Erstverordnender Arzt | | |
| Behandelnder Arzt | | |

* Ein neuer Plan kann unter: www.palliative-so.ch heruntergeladen werden oder via E-Mail: info@palliative-so.ch angefordert werden.

Herausgeber:

Verein palliativ.so, Patriotenvweg 10A, 4500 Solothurn, T 077 522 29 84, www.palliative-so.ch, info@palliative-so.ch

Urheberrecht:

Änderungen im Dokument «Palliative Reservemedikation®» sind nur in Absprache mit *palliative ostschweiz* möglich (info@palliative-ostschweiz.ch oder T 071 245 80 80).